

# 一週國(內)外疫情 115/03/02~115/03/08

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-03-03 初春氣溫多變 疾病傳播風險增 籲請民眾落實衛生好習慣 並儘速接種疫苗
- 115-03-03 國內新增 2 例腸病毒感染併發重症病例 請家長及教托育機構落實腸病毒防疫措施
- 115-03-05 國內新增 1 起麻疹境外移入致國內感染群聚事件 國際疫情持續 籲流行區返國民眾有疑似症狀速就醫並主動告知旅遊史
- 115-02-27 國內新增 1 起麻疹境外移入致國內感染群聚事件 呼籲民眾如有流行地區旅遊史或接觸史 出現疑似症狀速就醫並主動告知醫師

## 國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	印尼	麻疹
		泰國	豬鏈球菌感染症
	東亞	日本	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)、麻疹
		韓國	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
		香港	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
亞西	北亞	哈薩克	炭疽病
歐洲	南歐	西班牙	新型 A 型流感
非洲	中非	剛果民主共和國	麻疹
	西非	奈及利亞	拉薩熱
		塞內加爾	克里米亞-剛果出血熱
	東非	馬達加斯加	M 痘
		烏干達	克里米亞-剛果出血熱
美洲	北美	美國	麻疹
		加拿大	急性病毒性 A 型肝炎
	南美	巴西	登革熱
		玻利維亞	屈公病
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、M 痘

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

## 國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

### 返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。