

一週國(內)外疫情 115/03/09~115/03/15

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-03-10 國際呼吸道傳染病疫情持續 呼籲民眾儘速接種新冠及流感疫苗
- 115-03-10 疾管署呼籲年輕族群善用「性健康友善資源地圖」 保護隱私並守護自身健康
- 115-03-12 4月7日起提供65歲以上長者及免疫不全者等對象再增加接種1劑新冠疫苗 以提升免疫保護力 降低重症或死亡發生風險

國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	菲律賓	狂犬病
		越南	沙門氏菌感染症、狂犬病
	南亞	斯里蘭卡	登革熱
	東亞	日本	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
		韓國	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
		香港	麻疹
歐洲	北歐	丹麥	梅毒、先天性梅毒
	西歐	英國	沙門氏菌感染症
	東歐	捷克	急性病毒性A型肝炎
非洲	北非	蘇丹	霍亂
	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	西非	奈及利亞	拉薩熱
		迦納	M痘
美洲	北美	美國	麻疹
	中美	墨西哥	麻疹
		聖露西亞	屈公病
		古巴	屈公病
	南美	法屬圭亞那	屈公病
		蓋亞那	屈公病
		蘇利南	屈公病
委內瑞拉		黃熱病	
全球		新型A型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、立百病毒感染症	

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。