

# 一週國(內)外疫情 115/03/16~115/03/22

**若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩**

115-03-17 國內新增 1 例發熱伴血小板減少綜合症(SFTS)病例呼籲民眾於山林活動時採取防護措施避免蜱蟲叮咬

## 國外疫情：

地理位置	感染國家		感染疾病
亞太	東南亞	柬埔寨	新型 A 型流感
		泰國	麻疹
	東亞	日本	麻疹
		香港	急性病毒性 A 型肝炎
	大洋洲	澳大利亞	斐濟
歐洲	西歐	法國	李斯特菌症
		英國	流行性腦脊髓膜炎
非洲	北非	蘇丹	登革熱
	中非	剛果民主共和國	流行性腦脊髓膜炎
美洲	北美	美國	M 痘、病毒性腸胃炎(諾羅病毒)、漢他病毒症候群、麻疹
	中美	宏都拉斯	百日咳
	南美	阿根廷	M 痘、屈公病
		智利	登革熱
全球		玻利維亞	屈公病
			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、細菌性腸胃炎(仙人掌桿菌)

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

## 國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

### 返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。