一週國(內)外疫情 115/05/25~115/05/31

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

115-05-26 國內出現今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例 籲請民眾注意呼吸道衛生

115-05-26 防範登革熱 梅雨季節期間請民眾加強清除積水容器 落實「巡、倒、清、刷」

115-05-27 因應伊波拉國際疫情發展迅速，疾管署提升剛果民主共和國及烏干達旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」並強化邊境跨機關聯防，具上述旅遊史之入境旅客須配合「自主健康管理 21 天」

115-05-29 因應伊波拉疫情持續升溫 自 2026 年 6 月 2 日零時起 除四類對象外 90 天內暫停剛果民主共和國及烏干達居民入境

國外疫情：

地理位置	感染國家			感染疾病
亞太	東南亞		越南	登革熱
	南亞		斯里蘭卡	登革熱
			孟加拉	麻疹
	東亞		香港	M 痘
			中國	腸病毒
			日本	流感、鼻病毒、腸病毒、人類間質肺炎病毒感染、不明呼吸道疾病
	大洋洲	澳大利亞	澳大利亞	白喉
			澳洲	墨累河谷腦炎
		密克羅尼西亞	美屬關島	百日咳
歐洲	西歐		比利時	沙門氏菌感染症
非洲	北非		蘇丹	M 痘
	中非		剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
美洲	北美		美國	布氏桿菌病
	中美		墨西哥	布氏桿菌病、麻疹
			宏都拉斯	麻疹
			瓜地馬拉	麻疹
	南美		巴西	黃熱病
全球				新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、伊波拉病毒感染、漢他病毒症候群

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。