

一週國(內)外疫情 115/06/15~115/06/21

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-06-16 籲請民眾大雨過後整理戶內外環境 確實清除積水容器 如有登革熱疑似症狀請儘速就醫
- 115-06-16 國內新增 1 例腸病毒感染併發重症病例 請家長及教托育機構落實個人及環境衛生
- 115-06-16 國內新增 1 例日本腦炎病例 請民眾落實防蚊並按時攜帶家中幼兒接種日本腦炎疫苗

國外疫情：

地理位置	感染國家		感 染 疾 病
亞太	東南亞	越南	登革熱
	南亞	斯里蘭卡	登革熱
		孟加拉	麻疹
		印度	立百病毒感染症
	東亞	香港	新型 A 型流感
非洲	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	西非	奈及利亞	霍亂
	東非	烏干達	伊波拉病毒感染
美洲	北美	美國	麻疹、肉毒桿菌中毒、鼠疫
	中美	瓜地馬拉	麻疹
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。