

一週國(內)外疫情 115/08/03~115/08/09

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-08-04 國內新冠疫情上升且處流行期 呼籲尚未接種疫苗的民眾儘快接種 並落實勤洗手、戴口罩等自我防護措施
- 115-08-04 國內持續新增登革熱境外移入病例 請民眾出國期間落實防蚊措施 返國後如有不適症請儘速就醫
- 115-08-06 國內出現今年首例本土傷寒確定病例 籲請民眾注意飲食及手部衛生

國外疫情：

地理位置	感染國家		感 染 疾 病	
亞太	東南亞		菲律賓	登革熱
			泰國	登革熱
	南亞		印度	鉤端螺旋體病
			斯里蘭卡	登革熱
	東亞		韓國	腸病毒
	大洋洲	澳大利亞	巴布亞紐幾內亞	麻疹
歐洲	西歐		瑞士	退伍軍人病
非洲	中非		剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	東非		法屬留尼旺島	鉤端螺旋體病
			馬拉威	瘧疾
			烏干達	伊波拉病毒感染
美洲				麻疹
	北美		美國	環孢子蟲病、退伍軍人病、兔熱病
			加拿大	狂犬病
	中美		多明尼加共和國	M 痘
	南美		哥倫比亞	病毒性腸胃炎(諾羅病毒)
			智利	漢他病毒症候群
			巴西	麻疹
全球				新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、M 痘

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。