

一週國(內)外疫情 115/08/17~115/08/23

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-08-18 國內外近期流感疫情緩升，疾管署自今年 8 月 24 日起至 9 月 30 日擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件
- 115-08-18 國內新冠疫情仍處流行期 提醒各級學校於開學前妥為整備 加強自主防疫觀念宣導
- 115-08-18 七夕將至 呼籲浪漫時刻落實安全性行為；如有需求可多利用性傳染病伴侶服務之匿名第三方告知平台
- 115-08-21 因應伊波拉國際疫情 調整邊境暫行管制措施 針對剛果民主共和國措施延長 90 天 針對烏干達措施達預計自 8 月 28 日零時起解除

國外疫情：

地理位置	感染國家		感 染 疾 病
亞太	東南亞	緬甸	霍亂
		馬來西亞	登革熱
	南亞	孟加拉	麻疹
		尼泊爾	日本腦炎
		印度	日本腦炎
	東亞	南韓	瘧疾
		中國	急性病毒性 A 型肝炎
西亞	北亞	亞塞拜然	炭疽病
	中東	以色列	狂犬病
歐洲			西尼羅熱
	北歐	瑞典	麻疹
	西歐	英國	沙門氏菌感染症
		法國	退伍軍人病
非洲			白喉
	中非	剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
	東非	法屬馬約特島	M 痘
美洲			麻疹
	北美	美國	登革熱
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。