

一週國(內)外疫情 115/09/07~115/09/13

若病人有發燒、呼吸道症狀者請佩戴外科口罩

- 115-09-08 我國啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫外部評核」，強化跨部門治理與核心能力
- 115-09-08 流感及新冠仍有傳播風險 呼籲民眾出現症狀戴口罩就醫並在家休息 且留意重症危險徵兆
- 115-09-08 國內腸病毒疫情上升 呼籲民眾不可掉以輕心 應落實個人及環境衛生 降低疾病傳播風險
- 115-09-09 今年M痘境外移入個案已 10 例 為去年同期 2 倍 其中 6 例來自泰國 請前往流行地區或國內風險場域民眾應落實自我防護 符合公費接種資格者儘速完成 2 劑接種

國外疫情：

地理位置	感染國家		感 染 疾 病
亞太	東南亞	泰國	腸病毒
		菲律賓	鉤端螺旋體病
	南亞	孟加拉	登革熱、麻疹
		尼泊爾	大腸桿菌感染症等災後傳染病
	東亞	日本	流感併發重症
		韓國	流感併發重症
		中國	亞洲長角血蜱正內羅病毒(ALTNV)感染
西亞	北亞	蒙古	鼠疫
	中東	以色列	福氏內格里阿米巴腦膜腦炎
		葉門	霍亂
歐洲	西歐	法國	沙門氏菌感染症、退伍軍人病
	東歐	烏克蘭	M 痘
非洲	中非	安哥拉	M 痘
		剛果民主共和國	伊波拉病毒感染
美洲			麻疹
	北美	美國	登革熱
	中美	哥斯大黎加	急性病毒性 A 型肝炎
全球			新型 A 型流感、新冠併發重症、小兒麻痺症、M 痘

資料來源：衛生福利部疾病管制署-國際重要疫情資訊

國際間旅遊疫情建議等級表(請至衛生福利部疾病管制署連結網頁查詢)

分級標準	意涵	旅遊建議
第一級:注意(Watch)	提醒注意	提醒遵守當地的一般預防措施
第二級:警示(Alert)	加強預警	對當地採取加強防護
第三級:警告(Warning)	避免所有非必要旅遊	避免至當地所有非必要旅遊

返國後注意事項

若在旅途期間，有任何不明原因發燒或身體不適情形，或入境時如有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、皮膚出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹、骨頭關節酸痛、肌肉痛等症狀，請告知航空公司服務人員或機場檢疫人員。入境體溫測量如有發燒現象者，請依檢疫人員指示配合送醫診察、採檢或其他必要的檢疫防疫措施。

如回國後 21 日內有上述症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史。某些傳染病潛伏期達 6 個月以上，診斷時易忽略疾病與旅遊之關聯性，如有傳染病相關症狀出現，仍需告知醫師近期之旅遊史及接觸史，協助醫師診斷。